Alterações Climáticas em Portugal

Myriam Lopes

Departamento de Ambiente e Ordenamento

Sumário

- Emissões GEE em Portugal
- Evidências das AC em Portugal
- Projecções das AC em Portugal
- Políticas e Medidas para as AC

Emissões GEE em Portugal

PRINCIPAIS EMISSÕES DE GEE (CO₂, CH₄ e N₂O) E COMPROMISSOS PARA O PERÍODO 2008-2012

Nota: Os valores totais não entram em consideração com os LULUCF (*Emissions and Removals from Land-Use Change and Forestry - Floresta e Alterações do Uso do Solo*) e os "bunkers internacionais".

Emissões de GEE em 2007 e meta para o período 2008-2012

Fonte: EEA, 2009

■ Meta 2008-2012 ■ Emissões de GEE em 2007

Portugal tem tido dificuldade em controlar o aumento das emissões de GEE !

Emissões GEE em Portugal

Fonte: APA, 2010

Distribuição sectorial das emissões de GEE

As Evidências das AC em Portugal

Temperatura

Tendência da temperatura em Portugal

Fonte: Boletim Climatológico Anual, 2009

Temperatura

- **Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões até ao final do século XXI;**

- **Continente**

Aumento da temperatura máxima particularmente no Verão em cerca de 3°C na zona costeira e 7°C no interior

Grande incremento das ondas de calor

- **Regiões insulares**

Aumento moderados de Temperatura máxima

Madeira → 2°C – 3°C

Açores → 1°C – 2°C

Precipitação

2005 e 2007 foram os anos mais secos.

Precipitação

- **Maior incerteza em clima futuro**
- **Continente** | ↓ pp. Primavera
Verão
Outono
- **Região Sul** – com reduções 20-40% pp. Anual
- **Madeira** - ↓ pp. Inverno – Zonas Altas
- **Açores** | Variações pequenas na pp. Anual
↑ pp. Inverno

Aumento do nível médio do mar

Zonas críticas

- áreas ribeirinhas
- Vale do Tejo
- Ribeira do Porto
- Estuário do Sado
- Ria de Aveiro
- Ria Formosa

Aumento do nível médio do mar

Impactes:

- Erosão costeira com destruição das arribas
- alteração da linha de costa
- intrusão salina nos aquíferos costeiros
- ...

S. Pedro de Moel, situado na Orla Meso-Cenozóica Ocidental Portuguesa, onde se encontram afloramentos de grande interesse científico, pedagógico-didático e paisagístico, é uma região em risco.

Protecção da linha de costa - Parte norte do campo de esporões de Espinho - Maceda

Cheias

Zonas de risco actual de inundação em Portugal

Porto, 2010

Secas

Séries Históricas desde 1940

Projeções das AC em Portugal

Projecções para 2100... no mundo

Cenários SRES (Special Report on Emissions Scenarios) **do IPCC para emissões de GEE e de temperatura à superfície** – contabilizam o crescimento demográfico e o desenvolvimento tecnológico e económico até 2100. Nenhum dos cenários inclui políticas futuras já estabelecidas para as alterações climáticas.

Projecções para 2100... Portugal

Variacção na temperatura média

Projecções para 2100... Portugal

Variação na precipitação média

Impactes...

Impactes AC em Portugal: Incêndios Florestais

Área ardida média anual e número de incêndios que ocorreram em Portugal continental entre 1980 e 2009.

Impactes AC em Portugal: Risco de Incêndio

Índice meteorológico de risco de incêndio (FWI)

Δ FWI
(SRES A2 – referência)

Junho

Julho

Agosto

Δ FWI

Impactes AC em Portugal: Floresta

Em Portugal Continental

- Diminuição da produtividade florestal
- Alteração na distribuição dos tipos florestais dominantes
- Aumento período de secura estival (duração e intensidade)
- Substituição das espécies com maior exigência de água por espécies mais tolerantes à secura

Região Sul

- Substituição da área de floresta por matos e prados

Região Norte

- Substituição das espécies mais exigentes em água pelas espécies do Sul

Impactes AC em Portugal: Floresta

Na zonas Húmidas

Redução substancial na sua área de expansão de Ecossistemas florestais característicos de regiões mais húmidas ↪ **Carvalhais caducifólios**

Risco de "invasão" por espécies exóticas poderá ampliar
Aumento da área das espécies existentes (acácias, pitósporos,...)

Pitósporo - Pittosporum tobira

Região Alentejo

Diminuição da floresta existente (montados de sobreiro e azinheira) e sua substituição por comunidades de plantas esclerófitas estruturalmente mais pobres

Impactes AC em Portugal: Cheias

Não é um problema de hoje

Cheias de 1938 na cidade de Aveiro

Impactes AC em Portugal: Cheias

Mas hoje têm maior violência e causam impactes mais significativos

Cheias de 2010 na Ilha da Madeira
+ 40 mortos,
cerca de 100 feridos
+ de 200 pessoas sem casa)

Impactes AC em Portugal: Cheias

Resultantes de períodos de precipitação intensa e baixa capacidade de infiltração dos solos:

- Perdas materiais e humanas
- Interrupção actividade económica e social
- Contaminação dos recursos hídricos
- Erosão e perda de solos (particularmente se ocorrem após períodos de seca prolongada ou após incêndios florestais)

Impactes AC em Portugal: Stress hídrico

Varição da disponibilidade de água projectada para 2030, *Long Range Energy Modelling scenario project (LREM-E – business as usual)*

Aumento do stress hídrico (razão entre consumo e necessidade de água)

Deterioração da qualidade da água!

Impactes AC em Portugal: Ondas de Calor

Junho é o mês de Verão em que as ondas de calor ocorrem com maior frequência em Portugal Continental.

Desde a década de 1940, têm-se verificado ondas de calor de extensão espaço-temporal variável, tendo a frequência de ocorrência aumentado a partir da década de 90.

Os cenários futuros sugerem intensificação deste fenómeno com consequências para a saúde

Foram atribuídos **2000 óbitos** à onda de calor de **2003**, a mais severa de que há registo

Fontes: IM e INSA

Figura 1 - Onda de calor de Julho-Agosto de 2003, em Portugal.

Políticas e Medidas

Estratégia contra as AC em Portugal

Estratégia contra as AC em Portugal

Compromisso de Quioto

Metas Protocolo de Quioto

Percentagem de redução/incremento de emissões de GEE, nos Estados-Membros da UE-15, para o período de 2008-2012, face ao período de referência (1990)

Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC)

Primeira versão: aprovada em **2004**

- alinhado ao Plano Europeu para as AC

Segunda versão: aprovada em **2006**

- introduz pacote de medidas adicionais
- incluindo o Comércio Europeu de Licenças de Emissão
- criação do Fundo Português de Carbono

Revisto em alta **2007**

- reforço das fontes de energias renováveis (de 39 para 45% do consumo bruto de electricidade)
- aceleração da taxa de penetração dos biocombustíveis nos transportes
- redução das emissões do sector energia: microgeração, centrais a biomassa

Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC)

Eixos estratégicos:

Plano Nacional de Alocação de Licenças de Emissão (PNALE)

PLANE I: 2005-2007

- 244 instalações
- 38,9 MtCO₂e/ano

PLANE II: 2008-2012

- 212 instalações
- 34,81 MtCO₂e/ano

Estratégia contra as AC em Portugal

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAAC)

aprovada em 2010

Objectivos da ENAAAC

Informação e Conhecimento

Reduzir a Vulnerabilidade

Aumentar a Capacidade de Resposta

Participar, Sensibilizar e Divulgar

Cooperar a Nível Internacional

Sectores Estratégicos para Adaptação às AC

Ordenamento do Território e Cidades

Recursos Hídricos

Segurança de Pessoas e Bens

Saúde Humana

Energia e Indústria

Biodiversidade

Agricultura, Florestas e Pescas

Zonas Costeiras

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC)

Desenvolvimento e Implementação

As alterações climáticas são uma notável
ameaça à espécie humana,

mas...

representam também uma **oportunidade** de
repensar nas nossas opções e hábitos de vida!