INTERNATIONAL CONGRESS OF ENVIRONMENTAL HEALTH
CURSO DE SAUDE AMBIENTAL
GESTION DE RESIDUOS Y ANALIS DE CICLO DE VIDA (ACV)

Ángel Fernández Homar
Presidente de AEVERSU
presidencia@aeversu.es

La evolución histórica en materia de residuos

- **Residuos** $\Rightarrow$ Son un subproducto de la actividad humana. Siempre se han producido ...

Año	Acontecimiento
Hace más de 10000	Hombre cazador y recolector. La gestión de los residuos es muy simple; las cenizas del fuego, los huesos y residuos de animales se depositaban en el suelo para enriquecerlo y las herramientas y utensilios se abandonaban cuando ya no servían.

Año	Acontecimiento
S. XIII	En Europa los residuos se queman en fogatas fuera de las casas o se tiran, junto a las aguas sucias, a las calles. Los comercios se agrupan, constituyendo núcleos en los centros de las ciudades y aumentando el problema.

Año	Acontecimiento
1348 - 1349	La “Muerte Negra”, generada por las condiciones de higiene en las ciudades, mata dos terceras partes de la población en Europa. En 1408, Enrique IV establece que la basura debe permanecer en el interior de las casas hasta su retirada por los barrenderos.

Año	Acontecimiento
S. XVIII	Comienza la Revolución Industrial. Los bienes se producen más baratos, el consumo se dispara y la gente emigra a las ciudades. El crecimiento en la producción de residuos se hace evidente, y empiezan a proliferar colectivos que encuentran en los residuos una forma de vida, comerciando con materiales que encontraban en ellos.

Año	Acontecimiento
1848	En Reino Unido, el Acta Pública de Salud comienza el proceso de regulación de los residuos. Los residuos, que se sacan de las viviendas para acumularlos en hoyos hasta su recogida, son finalmente transportados en carretas de caballos hacia los pantanos.

Año	Acontecimiento
Principios del S. XX	La revolución de los envases y embalajes propicia la cultura de lo desechable. En 1930 el Reino Unido animaba a quemar en casa los residuos bajo el slogan “Quema tu basura-Reduce tus ratas”.

Año	Acontecimiento
2ª mitad del S. XX	La sociedad del consumo se consolida y la producción se incrementa exponencialmente. Aparecen nuevas corrientes de residuos y nuevos problemas. Los productos se diseñan para tirarse y los envases aumentan. La comercialización de productos en latas de aluminio o plástico crece y, para cubrir la demanda, se incrementa la manufactura de envases, la extracción de recursos no renovables, la agricultura y el procesamiento de alimentos. Todo ello genera nuevos residuos

Año	Acontecimiento
2ª mitad del S. XX	Paradójicamente, la segunda mitad del Siglo XX también trae consigo un incremento paulatino de la preocupación sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, ahorrar energía y conservar los recursos.

SOSTENIBILIDAD

GESTION INTEGRADA DE RESIDUOS

la cantidad y la peligrosidad.

Año	Acontecimiento
En la actualidad	<p data-bbox="639 305 1528 486">Publicación de la nueva Directiva Marco de Residuos, con los siguientes conceptos clave:</p> <ul data-bbox="678 558 1495 1262" style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 558 1495 829">- Objetivos concretos de reutilización y reciclaje para papel/cartón, vidrio, metales, plásticos, etc. en un horizonte cercano (2020)<li data-bbox="678 858 1495 958">- Establecimiento de criterios de fin de la condición de residuo.<li data-bbox="678 1001 1495 1262">- Consolidación del orden de prioridades en la gestión de residuos, con posibilidad de alterarlo en base al Análisis de Ciclo de Vida

POLÍTICAS EUROPEAS DE TIPO PREVENTIVO: JERARQUÍA DE PRIORIDADES

- ✓ REDUCIR LA CANTIDAD (MINIMIZACIÓN EN ORIGEN)
- ✓ REDUCIR LA PELIGROSIDAD
- ✓ DAR UN VALOR A LOS RESIDUOS: RECICLAJE MATERIAL Y RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

DE LAS PERSONAS Y EL

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE AUSCULTACIÓN AMBIENTAL

Herramientas y metodologías de auscultación ambiental

La herramienta tradicional más conocida de evaluación del perfil ambiental de una actividad es la **Evaluación de Impacto Ambiental**.

A esta metodología le han seguido otros instrumentos de protección del medio ambiente de carácter preventivo, entre los que cabe destacar el **Análisis de Riesgos Ambientales** y especialmente el **Análisis de Ciclo de Vida**.

Herramientas y metodologías de auscultación ambiental

El análisis de riesgos ambientales

Metodología de estudio, análisis y evaluación del riesgo ambiental, en términos de probabilidad de que la contaminación produzca efectos en determinados receptores: salud humana y medio ambiente.

Herramientas y metodologías de análisis

Herramientas y metodologías de análisis

RIESGO (R): Combinación de:

R = [toxicidad]

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV)

Como impactos deben considerarse el consumo de recursos, los efectos sobre la salud humana y la contaminación ambiental.

- ✓ ACIDIFICACIÓN
- ✓ EUTROFIZACIÓN
- ✓ TOXICIDAD
- ✓ CAMBIO CLIMÁTICO

- ✓ DISMINUCIÓN CAPA DE OZONO
- ✓ FOTO-OXIDANTES
- ✓ AGOTAMIENTO DE RECURSOS ABIÓTICOS

ACIDIFICACIÓN

Consiste en el cambio de pH normal del agua de lluvia debido a la acción de contaminantes atmosféricos.

Como ejemplo de emisiones de contaminantes por actividades humanas que generan acidificación están: el dióxido de azufre (que se convierte en ácido sulfúrico) y el óxido de nitrógeno (que se transforma en ácido nítrico).

ACIDIFICACIÓN

EFFECTOS

EUTROFIZACIÓN

La eutrofización deriva del enriquecimiento desmesurado en nutrientes.

Esto se traduce en un incremento de la producción de biomasa, con el consiguiente aumento de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), debido principalmente a niveles excesivamente altos de compuestos de nitrógeno o de fósforo

EUTROFIZACIÓN

EFECTOS

Blank area for notes or additional information.

TOXICIDAD

En esta categoría se contemplan los efectos negativos que tienen las sustancias tóxicas (mercurio, plomo, partículas, amianto, dioxinas, etc.) emitidas sobre los ecosistemas y la salud humana.

En las categorías de toxicidad el factor transporte tiene especial relevancia ya que los contaminantes tóxicos no permanecen en el medio (aire, suelo, agua superficial, etc.) donde fueron emitidos sino que pueden desplazarse y afectar otros ambientes.

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático se define como el impacto de las emisiones antropogénicas sobre las fuerzas radioactivas (por ejemplo, la absorción de la radiación del calor) de la atmósfera.

La mayoría de las emisiones relevantes al clima aumentan la incidencia global de la radiación solar, causando que la temperatura superficial media de la Tierra aumente. A esta situación comúnmente se le denomina “efecto invernadero”. Entre los gases de efecto invernadero se encuentran en CO_2 , CH_4 , N_2O , HFCs...

EFEKTOS

CAMBIO CLIMÁTICO

DISMINUCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

Alteración de la tasa de ozono en la estratosfera debido a la presencia de ciertos contaminantes, principalmente cloruros y bromuros procedentes de compuestos cloro-fluoro-carbonados, CFCs y otras fuentes.

La capa de ozono actúa como un filtro absorbiendo las dañinas ondas cortas de luz ultravioleta, mientras permite el paso de las ondas largas. La disminución de la capa de ozono provoca un incremento de la cantidad de rayos ultravioleta que llegan a la superficie de la Tierra.

DISMINUCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

EFFECTOS

FOTO-OXIDACIÓN

EFFECTOS

- Disminuye la actividad de la enzima que produce la melanina
- Reduce la actividad de la enzima que produce la queratina
- Elimina la queratina que protege a la piel de los rayos UV
- Elimina la queratina que protege a la piel de los rayos UV

AGOTAMIENTO DE RECURSOS ABIÓTICOS

Los recursos abióticos son recursos naturales (incluidos los recursos energéticos) tales como hierro, petróleo, etc.

El agotamiento de dichos recursos depende de las reservas existentes y las tasas de extracción del recurso que, combinados, ofrecen un indicativo de la gravedad del impacto.

EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA APLICADO A LOS MODELOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

AEVERSU

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV). ISO 14044:2006

Relaciona el sistema de gestión de residuos con los impactos que pueden ser generados por sus entradas y salidas. Como impactos deben considerarse el consumo de recursos, los efectos sobre la salud humana y la contaminación ambiental.

- ✓ ACIDIFICACIÓN
- ✓ EUTROFIZACIÓN
- ✓ TOXICIDAD
- ✓ CAMBIO CLIMÁTICO

- ✓ DISMINUCIÓN CAPA DE OZONO
- ✓ FOTO-OXIDANTES
- ✓ AGOTAMIENTO DE RECURSOS ABIÓTICOS

El ACV aplicado a los modelos de gestión de residuos (ISO 14044:2006)

Metanización

Figura 4.21. Impacto ambiental del proceso de **digestión** de residuos orgánicos.

AGOTAMIENTO RECURSOS (AA)	CALENTAMIENTO GLOBAL (CG)	TOXICIDAD HUMANA (TH)	FOTO-OXIDACIÓN (FQ)	ACIDIFICACIÓN (AC)	EUTROFIZACIÓN (EU)

La situación actual en la gestión de residuos

Las técnicas clave de gestión de residuos

- ✓ Reducir
- ✓ Reutilizar
- ✓ Reciclar
- ✓ Recurrir a la incineración
- ✓ Recurrir a la reutilización

La situación actual en la gestión de residuos

La realización de un análisis ACV en la forma anteriormente descrita tiene como marco general la consecución del desarrollo sostenible.

La situación actual en la gestión de residuos

SOSTENIBLES

La realización de un análisis ACV en la forma anteriormente descrita tiene como marco general la consecución del desarrollo sostenible.

El ACV es una herramienta que permite comparar el comportamiento ambiental de diversos sistemas, pudiendo emplearse para determinar sus ventajas y desventajas medioambientales.(tesis doctoral en la universidad Rovira y Virgili de Tarragona)

Se ha utilizado para comparar los siguientes escenarios:

- **Escenario 1: RS actual.** Vertedero no adecuado a normativa
- **Escenario 2: RS moderno.** Vertedero adecuado a normativa
- **Escenario 3: Digestión-RS moderno.** Combinación de metanización y vertedero
- **Escenario 4: ReCoRSmoderno.** Reciclaje, compostaje y vertedero
- **Escenario 5: ReCoIncineración.** Reciclaje, compostaje e incineración con recuperación de energía

Escenario 1: RS Actual

Figura 4.10. Impacto ambiental total del proceso de RS actual.

AGOTAMIENTO RECURSOS (AA)	CALENTAMIENTO GLOBAL (CG)	TOXICIDAD HUMANA (TH)	FOTO-OXIDACIÓN (FQ)	ACIDIFICACIÓN (AC)	EUTROFIZACIÓN (EU)

Escenario 2: RS Moderno

Figura 5.5. Contribución ambiental de cada etapa en el escenario RS moderno.

AGOTAMIENTO RECURSOS (AA)	CALENTAMIENTO GLOBAL (CG)	TOXICIDAD HUMANA (TH)	FOTO-OXIDACIÓN (FQ)	ACIDIFICACIÓN (AC)	EUTROFIZACIÓN (EU)

Comparativa escenarios

ESCENARIO	AGOTAMIENTO RECURSOS (AA)	CALENTAMIENTO GLOBAL (CG)	TOXICIDAD HUMANA (TH)	FOTO-OXIDACIÓN (FQ)	ACIDIFICACIÓN (AC)	EUTROFIZACIÓN (EU)

1
2
3
4
5

LA SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA

AEVERSU

La situación actual en la gestión de residuos

Los países europeos considerados como los más avanzados en la gestión de residuos (Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, Suecia y Suiza) tienen los ratios más elevados de reciclaje y recuperación de energía en plantas incineradoras, y los más bajos en eliminación de residuos en vertederos.

El cambio climático en el sector de la gestión de residuos

Emisiones CO₂ según tipo tratamiento

MUCHAS GRACIAS

Ángel Fernández Homar
Presidente de AEVERSU
presidencia@aeversu.es

AEVERSU